

Entero-✓

POULTRY

Produit de Santé Animale (NN.D5H1)

HOMOLOGATION
PAR SANTÉ CANADA 

- Recommandé pour maintenir une microflore intestinale en santé
- Contribue à la santé des fonctions digestives et du métabolisme général

INGRÉDIENTS

Combinaison **d'huiles essentielles** (cannelle et anis étoilé), sélectionnées pour **un large spectre d'actions** à utiliser en prévention de problèmes de **santé intestinale** causés par des **bactéries et coccidies** chez les poulets de chair, poules pondeuses et dindons.

Mélange exclusif **d'extraits botaniques** fonctionnels pour potentialiser les principes actifs :



MODES D'ACTION

- 1 Antibactérien
- 2 Anticoccidien
- 3 Anti-inflammatoire
- 4 Antioxydant
- 5 Antipyrétique

Bidon de 4 kg

EXTRAITS BOTANQUES	ACTIVITÉS	RÉFÉRENCES
Huile d'orange (<i>Citrus aurantium</i>)	Anti-inflammatoire systémique	Alessio et al., 2013
Curcuma (<i>Curcuma longa</i>)	Anti-inflammatoire systémique Anti-inflammatoire pulmonaire Antioxydant	Shehzad (2012) Danar Dono (2013) Akram (2010) Bansal (2010) Radwan (2008)
Bouleau odorant (<i>Betula pendula</i>)	Anti-inflammatoire systémique Antioxydant	Zhang (2006 et 2011) Munoz (2002)

Usage chez le poulet à griller

- ✓ Prévention de l'entérite nécrotique (utilisation de 16-23 jours)
- ✓ Départ des poussins pour atténuer l'impact du *E. coli* (utilisation de 0-10 jours)
- ✓ Départ des poussins en prévention contre *Enterococcus cecorum* (utilisation de 0-14 jours)
- ✓ Pallier au retrait des antibiotiques en finition (utilisation de 26-32 jours)
- ✓ Atténuation de la réaction vaccinale chez les lots vaccinés pour la coccidiose (14-24 jours)
- ✓ Élevage sans antibiotiques : prévention des problèmes de santé intestinale causés par *Clostridium perfringens* et coccidies (utilisation de 0-10 jours et 16-23 jours)



Usage chez la dinde

- ✓ Élevage conventionnel, lors du départ des dindonneaux (utilisation de 0-10 jours)
- ✓ Élevage conventionnel, en prévention du «flushing» (utilisation de 28-35 et 58-65 jours)

Usage chez la poule pondeuse

- ✓ Élevage sur parquet lors de désordres digestifs (exemple : entrée en ponte)

MODE D'EMPLOI

- DOSAGE**
- 250 ml par 1000 litres d'eau de boisson. **Équivalent à 500 ml dans 20 litres de solution mère**, médicamenteur réglé à **1:100**.
- PRÉCAUTIONS**
- S'assurer que les lignes d'eau sont propres et bien entretenues.
 - Ne pas mélanger avec un vaccin vivant dans la même solution mère.
- INTERACTION**
- Aucune interaction négative avec le chlore, les acidifiants et les antibiotiques ajoutés dans l'eau.
- DURÉE DE VIE**
- 24 mois à partir de sa date de fabrication (inscrite sur étiquette).

Développé et distribué par :

Services vétérinaires ambulatoires
TRIPLE V inc.

Un produit :

PROBIOTECH
INTERNATIONAL